N°. 2 <u>Ledran</u>

Dun ydrocelle avec supuration dans le corps du testicule

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE

Lydrocelle par Epanchement est le plus souvent une maladie simple, ~~[illegible]~~ a la quelle le Testicule n'a aucune part; mais souvent aussi il n'est qu'une complication de la maladie du Testicule.

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE

Lors qu'il est simple, on peut s'en tenir a une cure palliative, et se contenter d'Evacuer de temps en temps l'eau epanchée, par une — ponction faite a la Tumeur avec le troiquart; mais il ne guerira par- faitement, dumoins aux gens d'un age mur, qu'en ouvrant le kiste dans toute son etendüe, pour le faire supurer.

Quand l'ydrocelle est une complication de la maladie du Testicule, on peut encor se contenter d'y faire la ponction, tant que le vice de cette partie est leger

AC.15, d. 92 n°1

mais s'il devient considerable, la ponction n'a plus lieu, et il faut sans tarder, ~~[illegible]~~ travailler a la guerison de l'une et de l'autre maladie par une operation ~~[illegible]~~ telle que le cas le requerera.

le Testicule peut estre plus ou moins affecté et suivant le degré de sa maladie, l'hydrocelle demandera des attentions differentes. Ainsi tant que la maladie du Testicule n'aura rien d'urgent on pourra traitter l'hydrocelle par une cure palliative comme s'il etoit simple, mais si le Testicule s'altere a un certain point ou suppure, la cure palliative n'a doit plus avoir lieu et bientost il faut ~~[illegible]~~ proceder a l'ouverture de la tumeur.

En decembre 1724 je vis a Lahaye Mr Julien agé de 72 ans qui me montra un ydrocelle qui n'avoit commencé a se former que depuis un mois ou

6 semaines. Cet ydrocelle etoit au
costé gauche et formoit deja une
tumeur grosse comme la forme d'un
chapeau. Sa rondeur et son volume
m'empeschèrent de distinguer celuy
du Testicule; et en suivant le
cordon spermatique, je le sentis,
mesme plus haut que l'anneau du
Muscle oblique externe, dur, gonflé
et plus gros que le Pouce.
J'interrogeay le malade qui me ~~dit~~ dit
qu'il n'y sentoit aucune douleur, qu'il ne
se souvenoit de rien qui put avoir
donné lieu a cet ydrocelle, et ~~me~~
q dit n'avoit jamais eù de maladie
qu'on put soupçoner venir d'une
cause venerienne. Je n'avois donc
aucune preuve de la maladie du
Testicule, l'augmentation subite de la
Tumeur ne faisant auplus qu'un
prejugé, ainsi j'y fis la pontion avec

~~avec~~ le troiquart. Jen tiray environ 26 onces de liqueur, apres quoy il me fut facile de distinguer le testicule qui etoit tres dur, et avoit environ 3 pouces de diametre. Presque toute l'Eau que je tiray etoit assez claire mais comme sur la fin elle me parut un peu trouble, je la laissay reposer jusques au lendemain que l'ayant versée par inclination, je trouvay au fond la valeur d'une coquille de noix de liqueur blanche qui me parut etre du pus.

En moins de dix jours ~~les tumeurs~~ [le kiste] se remplit et la tumeur devint aussi grosse quelle l'avoit esté avant la ponction. ~~alors~~ [En meme temps] la fievre survint ce qui fit que je me contentay encor de faire la ponction au lieu d'ouvrir

la tumeur comme je l'avois projetté
dans la persuasion ou j'estois que le
testicule etoit trop malade pour nous
en tenir d'une cure palliative.

Je tiray autant de liqueur que la
premiere fois, mais ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ alors elle etoit
trouble, et ~~etant~~ l'ayant laissé reposer, j'y trouvay
plus de moitié de pus. Je connus par la
que la fievre estoit ~~causée~~ ~~par une~~ fievre de supuration et que le kiste s'etant rempli en moins
de huit jours, Je fendis la tumeur
dans toute son etendüe, et jusqu'
auprès de l'anneau de l'oblique.

Je trouvay le Testicule tres gros
et rond, ayant gardé sa figure
naturelle, colé contre la cloison
qui separe le scrotum. ~~[illegible]~~
~~[illegible]~~, la dureté et
le volume du cordon spermatique
et le grand age du malade —

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE

m'empecherent d'aler plus loin et
je laissay le Testicule, me contentant
d'emporter une partie des levres de
la playe, pour ~~le~~ rendre les ~~p..~~ pansem^d
plus faciles.
Apres cette ouverture la fievre
cessa entierement et ~~.........~~
~~........~~ la playe se remplissoit
peu a peu, lors que le 10^e jour de
l'operation il prit au malade un
grand accez de fievre qui commença par un ~~.........~~
frisson. Deux jours apres cet accez,
il parut sur le corps du Testicule
un trou presque imperceptible par
le quel je vis sortir une tres petite
goutte de pus, et ma sonde introduite
par ce trou jusque dans le corps du
Testicule, se trouva dans un vuide
ou je la promenois. Il me fut facile
de juger qu'il s'y etoit fait un abcez
dont le frisson avoit eté le prelude.

Je l'ouvris de haut en bas, et j'en
tiray 3 cuillerées de pus louable.
Le corps du Testicule etoit a toute
la circonférence du vuide epais d'un
pouce et d'une substance ferme,
ressemblante en quelque maniere a
la substance corticale du Rein. Les
memes raisons qui m'avoient empeché
de le retrancher subsistoient encor,
ainsi je me contentay d'un pancement
simple et methodique; moyennant
le quel la tumeur s'amolit peu a peu.

Je partis de Lahaye au bout de
quelques jours, et je laissay le soin
du malade a Mr Destendau —
chirurgien françois etabli dans
ce lieu. Au bout de deux mois
il me manda que toute la dureté
s'estoit fondue, que le vuide qui etoit

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

N. 24

dans le centre du Testicule s'etoit
rempli et que le tout etoit entierement
cicatrisé; mais que le cordon sper
matique avoit conservé sa dureté
et son volume. Le malade est encor
en parfaite santé malgré son age
et tout le scrotum est en bon etat

Le Dran